

Viorne

Viburnum

Arbuste de la famille des Caprifoliacées (Abélia, Kolkwitzia, Lonicera, Sureau noir, Viorne, Weigela).

Étymologie : "Viorne" vient du latin *viburnum* - de *viere*, "tresser".

Taille maximale : arbustes de 1-4 m.

Origine : pourtour méditerranéen.

Habitat : les viornes supportent l'ombre et préfèrent les sols profonds, humifères. Éviter les zones ventées.

Feuillage caduc ou persistant.

Le genre *Viburnum* compte plus de 200 espèces, toutes arbustives, à feuillage caduc ou persistant. On trouve parmi les *Viburnum* des plantes bien connues des jardiniers comme le laurier tin (*Viburnum tinus*) à fleurs hivernales, mais non parfumées et à feuillage persistant ou la boule de neige (*Viburnum opulus* 'Flore Pleno'). Le *Viburnum rhytidophyllum* au feuillage persistant gaufré, vert foncé est très utilisé pour les haies libres. On apprécie aussi les nombreux cultivars de *Viburnum plicatum*, aux magnifiques fleurs printanières et aux jolies couleurs d'automne.



Issu de l'hybridation de *Viburnum grandiflorum* et de *Viburnum farreri*, la viorne bodnantense porte des bouquets de fleurs tubulaires parfumées roses, qui apparaissent avant le feuillage. C'est un arbuste idéal pour illuminer une haie libre durant la période hivernale, qui se cultive sans difficulté. Par contre, sa floraison passée, *Viburnum x bodnantense* n'est pas d'un grand intérêt décoratif.

Dans quelle terre faut-il planter les viornes parfumées ?

D'une manière générale, les viornes se caractérisent par leur facilité d'adaptation dans tous les types de sols, surtout lourds. Toutefois, un apport généreux de matières organiques bien décomposées au moment de la plantation, sera très apprécié.

Avec quoi associer une viorne d'hiver pour lui donner un gain d'attrait durant la belle saison ?

Une clématite à grandes fleurs, ou des pois de senteur feront merveille au pied d'une viorne. Ces grimpantes garniront joliment l'arbuste, sans nuire le moins du monde à sa croissance.

Est-il normal qu'une viorne ait à peine poussé après un an de plantation ?

Tout à fait, car ces arbustes (comme beaucoup d'autres d'ailleurs) montrent une certaine paresse à la reprise, surtout s'ils sont plantés lorsque la végétation est déjà démarrée. Choisissez de préférence des sujets présentés en conteneurs, qui disposent de l'ensemble de leur système racinaire. Le "stress" de la plantation sera beaucoup moins marqué.

L'astuce

Installez la plante à proximité des chemins les plus passagers de votre jardin, vous aurez ainsi le bonheur d'apprécier le parfum à chaque passage. Pour un effet parfumé complètement renversant, associez *Viburnum x bodnantense* à un *Sarcococca orientalis*. Ce petit arbuste persistant, originaire de Chine ne pose aucun problème de culture s'il se trouve dans un jardin bien abrité (il supporte -10 °C). Ses petites fleurs blanches en clochettes exhalent un puissant parfum de jacinthe, qui se marie bien avec la fragrance capiteuse de la viorne.

Viorne Bodnantense *Viburnum x bodnantense*

Famille : Caprifoliacées

Origine : horticole

Période de floraison : de décembre à janvier

Couleur des fleurs : blanc plus ou moins rosé, fleurs parfumées

Exposition : plein soleil, mi-ombre

Type de sol : Tous les types de sols, même un peu calcaires sont bien acceptés, à l'abri des vents froids et desséchants (de l'est)

Acidité du sol : neutre, acide, alcalin

Humidité du sol : frais

Utilisation : haie libre, isolé

Hauteur : 3 m, envergure de 2 m

Type de plante : arbuste à fleurs

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : caduc

Rusticité : très rustique (-10°C à 15°C)

Plantation, rempotage : printemps, automne

Méthode de multiplication : bouturage, marcottage

Taille : laissez se développer les arbustes naturellement durant 4 à 5 ans après la plantation, sans intervenir. Ensuite, taillez les viornes d'hiver adultes après la floraison, en réduisant des 2/3 de leur longueur les rameaux qui ont fleuri et en équilibrant l'ensemble de la ramure

Espèces, variétés intéressantes :

Le genre comprend plus de 200 espèces

- *Viburnum x bodnantense* 'Charles Lamont', rose foncé
- *Viburnum x bodnantense* 'Dawn', rose clair
- *Viburnum x bodnantense* 'Deben', blanc rosé

Maladies et insectes nuisibles : résistants aux parasites, les diverses petites taches foliaires qui peuvent se former sur les feuilles sont dues à des champignons, mais elles n'affectent pas le développement de l'arbuste.

Toxicité :



Viorne obier

Viburnum opulus

Famille : Caprifoliacées

Origine : Asie, Europe

Période de floraison : mai, juin

Couleur des fleurs : fleurs blanches Stériles et fertiles en corymbes plats.

Exposition : soleil, mi-ombre

Type de sol : riche en humus

Acidité du sol : neutre

Fréquence d'arrosage : Copieux en été en cas de sécheresse, surtout en terrain naturellement sec.

Vitesse de croissance : Rapide

Période de plantation : De Novembre à Février

Mode de multiplication : semis, Bouturage.

Période de multiplication : De Août à Septembre

Type de taille recommandée : Taille de nettoyage.

Période pour tailler : De Juillet à Août

Types de sol recommandé : Calcaire Humifère Argileuse

Humidité du sol : normal

Utilisation : haie libre, fond de massif

Hauteur : 4 m

Type de plante : arbuste à fleurs

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : caduc feuilles lobées, irrégulièrement dentées, pubescentes à la face inférieure, devenant rouge en automne avant leur chute, fructification rouge

Rusticité : rustique

Espèces, variétés intéressantes :

l'espèce type à ses fleurs plates

- *Viburnum opulus* 'Sterile' la boule de neige

Maladies et insectes nuisibles : les pucerons noirs

Toxicité : Ses fruits contiennent de la saponine et une essence spécifique, baptisée "viburnine" ; ces deux principes sont toxiques et peuvent provoquer des irritations et des gastro-entérites. Néanmoins, l'homéopathie l'utilise pour soigner les douleurs de l'abdomen chez les femmes pendant les règles et les irritations des ovaires. Arbuste décoratif de jardin.

L'espèce cultivée ne possède que des fleurs "stériles" identiques à celles de la couronne extérieure de l'inflorescence de l'espèce sauvage. De ce fait elle ne fructifie pas et l'inflorescence d'un blanc très pur ne forme plus une ombelle mais une "boule" de "neige".



Différentes variétés :

'Compactum' au port arrondi compact et régulier de très structuré, fruits rouge vif en août-septembre, persistant jusqu'en hiver - 'Notcutt's Variety', arbuste moyen, magnifique en automne par ses fruits rouges - "Xanthocarpum", de taille moyenne, érigé, fruits jaune d'or devenant translucides à maturité, en grosses grappes - 'Park Harwest", arbuste moyen, feuilles lobées, entièrement jaune paille, à peine balayées de vert vif - *Viburnum plicatum* ou boule de neige du Japon, ou boule de neige de Chine, introduit en en 1844, taille moyenne, très touffu, port étalé, fleurs blanches en cymes sphériques disposés le long des branches arquées - *Viburnum plicatum* 'Cascade', belles ombelles blanches, très florifère - *Viburnum plicatum* 'Dart's Red Robin', floraison estivale spectaculaire en ombelles blanc pur suivie de fruits rouges - *Viburnum plicatum* 'Lanarth',



taille moyenne, à port horizontal en plateaux, grandes fleurs plates, blanches mi-stériles, mi-fertiles - *Viburnum plicatum*, 'Mariesii', arbuste moyen, port élégant, très large, port horizontal, grandes fleurs plates, blanches, mi-stériles, mi-fertiles, comme posées sur les branches, coloris d'automne exceptionnel. *Viburnum plicatum* 'Rotundifolium', arbuste de 2 m 50, nombreuses fleurs blanches en boules plus grosses que sur le type, belle coloration rouge en automne pour les feuilles rondes - *Viburnum plicatum* 'Shasta', Etats-Unis, 2 m, belle floraison blanche d'un éclat exceptionnel dû à la double rangée de fleurs posées sur les branches, fruits rouge éclatant devenant noirs - *Viburnum plicatum* 'Watanabe', arbuste de taille moyenne à port érigé avec des branches horizontales, corymbes blancs, floraison remontante de mai à septembre, en continu.

Mode de conservation :

Les baies de couleur rouge vif se développent de septembre à décembre. Elles contiennent des substances vésicantes provoquant une irritation de la peau et des muqueuses de la bouche, des troubles du rythme cardiaque, des diarrhées, des vertiges et une dilatation des pupilles.

Conseils d'utilisation :

Isolé, groupes, massifs arbustifs, haies libres et fleuries.

Notre conseil :

Arbuste apprécié pour la beauté de sa floraison. C'est après la floraison qu'il est possible de le tailler, si nécessaire. Mais généralement on se contente d'effectuer une taille de nettoyage,

consistant à aérer le centre de la ramure, à supprimer le bois mort lorsque la plante est âgée, à régulariser sa forme. Pour que cet arbuste fleurisse bien, la taille ne doit pas être trop sévère. Multiplication par boutures effectuées en août en prélevant les tronçons de tige sur des pousses pas trop vigoureuses, latérales. Raccourcir ces tiges à 10 cm environ. Enlever les feuilles de la base, puis repiquer dans une terre très légère riche en sable, après avoir trempé la base de la bouture dans une hormone d'enracinement.

Placer la plantation sous un châssis ombré et fermé, en maintenant une bonne humidité de l'air par des vaporisations régulières. La mise en godets a lieu en automne. Hivernage sous un châssis froid hors gel pour l'hiver.



Laurier-tin

Viburnum tinus

Famille : Caprifoliacées

Origine : Hémisphère nord

Période de floraison : hiver, printemps, automne

Couleur des fleurs : blanc

Exposition : soleil

Type de sol : ordinaire, frais

Acidité du sol : neutre à légèrement acide

Humidité du sol : normal

Utilisation : haie libre fleurie, haie taillée

Hauteur : 4 m

Type de plante : arbuste

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : persistant

Rusticité : rustique

Plantation, rempotage : automne, printemps

Méthode de multiplication : bouturage

Taille : Si il doit être taillé, faites-le après la fructification.

Espèces, variétés intéressantes :

- *Viburnum tinus* 'Variegatum' au feuillage panaché

Maladies et insectes nuisibles : les araignées rouges

Toxicité : -

C'est un arbuste qui apportera des fleurs à votre haie en hiver, puisque sa floraison blanche s'étale de novembre jusqu'au printemps.



Viorne ridée

Viburnum rhytidophyllum

Famille : Caprifoliacées

Origine : Chine du centre ouest

Période de floraison : mai, juin

Couleur des fleurs : blanc crème

Exposition : soleil

Type de sol : ordinaire

Acidité du sol : normal

Humidité du sol : frais

Utilisation : haie libre, isolé

Hauteur : 5 m

Type de plante : arbuste à fleurs

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : persistant



Rusticité : très rustique

Plantation, repotage : printemps, automne

Méthode de multiplication : semis, bouturage en été

Taille : taillez éventuellement les branches disgracieuses

Espèces, variétés intéressantes :

Le genre comprend plus de 200 espèces

- *Viburnum rhytidophyllum* 'Holland' au port compact

Maladies et insectes nuisibles : les taches noires, les pucerons

Toxicité : fruits non comestibles

La Viorne à feuilles ridées est un arbuste vigoureux aux feuilles allongées pendantes et aux nervures très marquées. Les fleurs apparaissent au printemps en cymes de couleur blanc-crème. Il produit des fruits non comestibles rouges qui sont décoratifs à l'automne

Viorne lantane

Viorne cotonneuse

Viorne mansienne

Viburnum lantana

Famille : Caprifoliacées

Origine : Europe, Asie de l'ouest

Période de floraison : mai

Couleur des fleurs : blanc

Exposition : soleil, mi-ombre

Type de sol : drainé, riche

Acidité du sol : neutre

Humidité du sol : frais

Utilisation : haie libre, isolé

Hauteur : 5 m

Type de plante : arbuste à fleurs

Type de végétation : vivace



Type de feuillage : caduc

Rusticité : rustique

Plantation, repotage : printemps, automne

Méthode de multiplication : semis, bouturage en été

Taille : coupez les fleurs fanées, taillez après la floraison pour lui conserver une forme compacte

Espèces, variétés intéressantes :

Le genre comprend plus de 150 espèces

- *Viburnum lantana* 'Aureum' - variété au jeune feuillage jaune
- *Viburnum lantana* 'Mohican' - une variété populaire compacte
- *Viburnum lantana* 'Variegatum' - une variété au feuillage panaché

Maladies et insectes nuisibles : les taches noires, les pucerons, les charançons

Toxicité :  fruits toxiques

La Viorne cotonneuse est un arbuste de bonne rusticité, intéressant dans les haies libres pour son inflorescence blanche, son feuillage rouge en automne et ses fruits rouges à noirs décoratifs.

Viorne de Chine

Viburnum plicatum

Famille : Caprifoliacées

Origine : Chine, Japon

Période de floraison : mai, juin

Couleur des fleurs : blanc

Exposition : mi-ombre

Type de sol : riche

Acidité du sol : neutre

Humidité du sol : frais

Utilisation : isolé, massif, bac

Hauteur : de 2 à 3 m selon les variétés

Type de plante : arbuste à fleurs

Type de végétation : vivace

Type de feuillage : caduc

Rusticité : rustique

Plantation, repotage : automne

Méthode de multiplication : bouturage

Taille : -

Espèces, variétés intéressantes :

- *Viburnum plicatum* 'Watanabe' à la longue floraison
- *Viburnum plicatum* 'Mariesii'

Maladies et insectes nuisibles : les pucerons noirs

Toxicité : ⚠ attention aux fruits

Pas de taille pour ce viorne à la silhouette toute à fait particulière. Il sera de plus bel effet isolé dans un massif, ou son allure, ses fleurs et son feuillage rouge l'automne venu attireront immanquablement le regard et ce toute l'année

